

Kikhoste (Pertussis)	7 – 10 dager	Hoste, feber og rennende nese i ca 1. uke. Senere hosteanfall, særlig om natten og med brekninger. Ikke alltid kiking dersom vaksinert.	Svært smittsom Nærdråpesmitte i forbindelse med hosteanfall. Smitteførende perioden varierer ca. 3 uker fra symptomdebut, eller inntil 5 dager etter oppstart av antibiotika behandling.	Ja (V)	Kontakt lege, og holdes hjemme etter legens anvisning. Syrer konfererer med kommunelegen dersom det blir påvist kikhoste i barnehagen.
Meslinger (Morbill)	10 -14 dager	Prodromalstadium(V) med feber, hoste, snue, lysskyhet. I løpet av et par dager enanlem i munnen (koppliske flekker). Deretter fallende feber som så stiger samtidig med begynnelde meslingutslett. Utslettet begynner vanligvis bak ørene og spri seg raskt til hele kroppen. Utslett: vedvarende feber og andre symptomer varer vanligvis 2 til 5 dager.	Svært smittsomt Luftsmitte (fjendråpesmitte) og kontaktsmitte med sekret fra luftveier. Den smitteførende perioden regnes fra prodromalstadiet til 3-5 dager etter opptrøden av utslett.	Nei	Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst 4 dager etter opptrøden av utslett dersom allmennitstanden ellers er god.
Røde hunder (Rubella)	14 – 21 dager, vanligvis 16 – 18 dager	Opp til halvparten av de smittede har få eller ingen symptomer. Moderat feber og utslett som brer seg fra ansikt til hele kroppen. Forstørrede lymfeknuter på halsen.	Nærdråpesmitte. Smitteførende 1 uke før og minst 4 dager etter utbrudd av utslett.	Nei	Barnet kan vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett. NB! Gravide arbeidstakere V)
Skarlagens- feber	1 – 3 dager	Høy feber, rød tunge (jordbærtunge), fimprikket utslett og hudavskalling 1-2 uker etter sykdomsstart på de steder hvor utslettet har vært mest markert som på hender og føtter.		Det er sjelden man får det mer enn én gang.	Barn skal holdes hjemme til de har vært på full penicillin dose i minst ett døgn. I tillegg må barna være klinisk friske og feberfrie.
Tuberkulose		Lite symptomer i begynnelsen av forløpet.	Dråpesmitte og luftsmitte (fjendråpesmitte) fra en person med smitteførende lungetuberkulose.		Ved påvist tuberkulose hos et barnhagebarn må det gjøres en individuell vurdering når barnet kan gå tilbake i barnehagen. Barnelege, infeksjons-medisiner eller Folkehelseinstituttet kan gi råd i en slik situasjon. Barn med tuberkuløs sykdom er sjelden smitteførende
Vannkopper (Varicella)	2 – 3 uker, vanligvis 14 dager.	Let feber, rask utvikling av utslett til vesikler, også slimhinner. Kløe. Vesikler tørker inn og skorperne faller av i løpet av 1-2 uker.	Svært smittsomt 1-2 dager før utslett og til utslettet tørker inn, vanligvis 5 dager.	Nei	Kan gå i barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. Dersom barn/søsken til barn i barnehagen har kreft el. Immunsvikt, skal disse og kommunehelsejefenesten umiddelbart informeres med mistanke om vannkopper i barnehagen. Hindre kontakt med gravide.